

Nome genérico	Nome comercial	Formulação	Dose padrão (adulto)	Comprimidos/dia	Efeitos secundários	Restrições alimentares
Regimes de Comprimido Único (INTR/INNTR)						
Dolutegravir / abacavir / lamivudina	Triumeq®	Comprimido com 50 mg dolutegravir, 600 mg abacavir e 300 mg lamivudina	Um comprimido/dia	1	Ver dolutegravir, abacavir e lamivudina	Tomar com ou sem comida
Efavirenze / emtricitabina / tenofovir	Atripla®	Comprimidos com 600 mg efavirenze, 200 mg emtricitabina e 245 mg tenofovir	Um comprimido/dia	1	Ver efavirenze, emtricitabina e tenofovir	Tomar sem comida, de preferência ao deitar
Elvitegravir / cobicistate / emtricitabina / tenofovir	Stribild®	Comprimido com 150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistate, 200 mg de emtricitabina e 245 mg tenofovir	Um comprimido/dia	1	Comuns: náuseas, diarreia, sonhos vividos, dor de cabeça, fadiga, tonturas, insónias, exantema, flatulência e sonolência. Raros: problemas hepáticos graves, problemas renais e enfraquecimento ósseo	Tomar com a refeição
Rilpivirina/ emtricitabina/ tenofovir	Eviplera®	Comprimido com 25 mg rilpivirina, 200 mg emtricitabina e 245 mg tenofovir	Um comprimido/dia	1	Ver rilpivirina, emtricitabina e tenofovir	Tomar com a refeição
Formulações de dose fixa (INTR)						
Abacavir / lamivudina	Kivexa®	Comprimido com 600 mg abacavir e 300 mg lamivudina	Um comprimido/dia	1	Ver abacavir e lamivudina	Tomar com ou sem comida
Abacavir / lamivudina / zidovudina	Trizivir®	Comprimido com 300 mg abacavir, 150 mg de lamivudina e 300 mg zidovudina	Um comprimido duas vezes/dia	2	Ver abacavir, lamivudina e zidovudina	Tomar com ou sem comida
Emtricitabina / tenofovir	Truvada®	Comprimido com 200 mg emtricitabina e 245 mg tenofovir	Um comprimido/dia	1	Ver emtricitabina e tenofovir	Preferencialmente com a refeição, mas pode ser sem comida
Lamivudina / zidovudina	Combivir®	Comprimido com 150 mg lamivudina e 300 mg zidovudina	Um comprimido duas vezes/dia	2	Ver lamivudina e zidovudina	Tomar com ou sem comida
Inibidores Nucleósidos da Transcriptase Reversa (INTR)						
Abacavir	Ziagen®	Comprimido de 300 mg	300 mg duas vezes/dia ou 600 mg uma vez/dia	2	Comuns: náuseas, vômitos, diarreia, febre, dor de cabeça, dor abdominal, cansaço e perda de apetite Raros: reação de hipersensibilidade e acidose láctica	Tomar com ou sem comida
Emtricitabina	Emtriva®	Cápsula de 200 mg	Uma cápsula/dia	1	Comuns: náuseas, diarreia, dor de cabeça, alteração da função renal e escurecimento da pele Raros: acidose láctica e dano hepático	Tomar com ou sem comida
Lamivudina	Epivir®	Comprimidos de 150* e 300mg	Um comprimido de 150 mg duas vezes/dia ou 300 mg um vez/dia	2	Comuns: náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, dor abdominal, queda de cabelo, febre, insónias, exantema, cansaço e dor nas articulações Raros: acidose láctica e danos hepáticos	Tomar com ou sem comida
Zidovudina	Retrovir®	Cápsulas de 100 e 250 mg*	Uma cápsula de 250 mg duas vezes/dia	2	Comuns: náuseas, vômitos, cansaço, dor de cabeça, tonturas, fraqueza, dor muscular, perda de apetite e febre Raros: alterações no hemograma, lipodistrofia e acidose láctica	Tomar com ou sem comida
Inibidores Nucleótidos da Transcriptase Reversa (INTR)						
Tenofovir	Viread®	Comprimido de 245 mg	Um comprimido uma vez/dia	1	Comuns: náusea, vômitos, diarreia, flatulência, tonturas, níveis baixos de fosfato no sangue, fraqueza, exantema, dor de cabeça, dor de estômago, fadiga e inchaço Raros: problemas renais e enfraquecimento ósseo	Tomar com a refeição
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)						
Efavirenze	Stocrin®/ Sustiva®	Comprido* de 600 mg e cápsula de 200 mg	Um comprimido/dia	1 ou 3	Comuns: exantema, tonturas, perturbações do sono, sonos vividos, dificuldades de concentração, náusea, vômitos, dor de cabeça, cansaço, ansiedade, depressão e depressão Raros: psicose, exantema severo e problemas hepáticos	Tomar sem comida, de preferência ao deitar
Etravirina	Intelence®	Comprimidos de 100 e 200 mg*	200 mg duas vezes/dia	2 ou 4	Comuns: exantema, neuropatia periférica Raros: exantema severo (síndrome de Stevens Johnson)	Tomar com comida
Nevirapina	Viramune®	Comprimido de 200 mg	200 mg por dia durante duas semanas e depois 200 mg duas vezes/dia	2	Comuns: toxicidade hepática, reação alérgica, exantema, náuseas, dor de cabeça, cansaço, dor de estômago e diarreia Raros: exantema severo (síndrome de Stevens Johnson)	Tomar com ou sem comida
Nevirapina (libertação prolongada)	Viramune®	Comprimido de 400 mg	Um comprimido de 400mg uma vez/dia após o período de indução com nevirapina na formulação regular	1	Comuns: toxicidade hepática, reação alérgica, exantema, náuseas, dor de cabeça, cansaço, dor de estômago e diarreia Raros: exantema severo (síndrome de Stevens Johnson)	Ingerir inteiro. Tomar com ou sem comida
Rilpivirina	Edurant®	Comprimido de 25 mg	Um comprimido de 25 mg uma vez/dia	1	Comuns: insónias, dor de cabeça, exantema, aumento das enzimas hepáticas, depressão, tonturas, dores de cabeça e vômitos Raros: doses superiores a 25 mg podem causar alterações do ritmo cardíaco	Tomar com a refeição
Inibidores da protease						
Atazanavir	Reyataz®	Cápsulas de 150, 200 e 300 mg*	300 mg com 100mg ritonavir/dia	2 ou 3 §	Comuns: náuseas, diarreia, exantema, dor de estômago, dor de cabeça, insónias, vômitos, hiperbilirrubinemia, lipodistrofia, toxicidade hepática e diabetes Raros: pedras nos rins, alteração na função hepática e alterações do ritmo cardíaco	Tomar com a refeição
Darunavir	Prezista®	Comprimidos de 600 mg* e 800 mg	800mg com 100 mg de ritonavir uma vez/dia ou 600 mg com 100mg de ritonavir duas vezes/dia	2 a 4 §	Comuns: diarreia, náuseas, exantema, dor de estômago, vômitos, dor de cabeça, lipodistrofia, toxicidade hepática, diabetes e febre Raros: alteração na função hepática e alterações do ritmo cardíaco	Tomar com a refeição
Fosamprenavir	Telzir®	Comprimido de 700 mg	700 mg com 100 mg de ritonavir duas vezes/dia	4 §	Comuns: aumento do lípidos, náuseas, vômitos, diarreia, exantema, dor abdominal, dor de cabeça, tonturas, cansaço, formigueiro à volta da boca, alterações na função hepática e pancreática, lipodistrofia, toxicidade hepática e diabetes Raros: exantema severo e alterações no ritmo cardíaco	Tomar com ou sem comida
Lopinavir / ritonavir	Kaletra®	Comprimido com 200 mg lopinavir e 50 mg ritonavir	Dois comprimidos duas vezes/dia ou quatro comprimidos uma vez/dia.	4	Comuns: lipodistrofia, aumento das enzimas hepáticas, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, fraqueza, azia, dor de cabeça, aumento do colesterol, toxicidade hepática e diabetes Raros: alterações do ritmo cardíaco	Ingerir inteiro. Tomar com ou sem comida
Ritonavir	Norvir®	Comprimido de 100 mg	Dose completa: 600 mg duas vezes/dia. Para potenciar outros IP: 100-200 mg uma ou duas vezes/dia.	12 a 4	Comuns (dose completa): aumento dos lípidos e enzimas hepáticas, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, fraqueza, lábios dormentes, mau paladar, lipodistrofia, toxicidade hepática e diabetes. Comuns (dose baixa): aumento dos lípidos Raros: alterações do ritmo cardíaco	Ingerir inteiro. Tomar com comida para evitar náuseas
Tipranavir	Aptivus®	Cápsula de 250 mg	500 mg com 200 mg ritonavir duas vezes/dia	8 §	Comuns: náuseas, diarreia, vômitos, dor abdominal, cansaço, dor de cabeça, febre, alterações hepáticas, exantema, lipodistrofia, toxicidade hepática, diabetes, aumento dos lípidos e flatulência Raros: hemorragia cerebral e alterações do ritmo cardíaco	Tomar com a refeição
Inibidor do CCR5						
Maraviroc	Celsentri®	Comprimidos de 150* e 300 mg	300 mg duas vezes/dia ou 150 mg duas vezes/dia com todos os IP potenciados com ritonavir à exceção do tipranavir e fosamprenavir ou 600 mg duas vezes/dia com efavirenze ou etravirina sem um IP potenciado com ritonavir	2 a 4	Comuns: náuseas, diarreia, fadiga e dor de cabeça Raros: reação alérgica e problemas hepáticos	Tomar com ou sem comida
Inibidores da Integrase						
Dolutegravir	Tivicay®	Comprimido de 50 mg	50mg uma vez/dia ou 50 mg duas vezes/dia com efavirenze, nevirapina ou tipranavir, ou em casos de VIH resistente a inibidores da integrase	1 ou 2	Comuns: náuseas, diarreia, dor de cabeça, exantema, comichão, vômitos, desconforto ou dor de estômago, insónias, tonturas, sonhos vividos, fadiga, flatulência e aumento das enzimas hepáticas e musculares Raros: reações alérgicas e problemas no fígado	Tomar com ou sem comida
Elvitegravir	Vitekta®	Comprimido de 85, 150mg*	85 mg uma vez/dia com atazanavir/ritonavir ou lopinavir/ritonavir ou 150 mg uma vez/dia com darunavir/ritonavir ou fosamprenavir/ritonavir	1	Comuns: dor no estômago, vômitos, exantema, dor de cabeça, diarreia, náuseas e cansaço Raros: depressão, ideação suicida, insónias, problemas de digestão (dispepsia), sensação de inchaço, flatulência, tonturas, formigueiro, sonolência e mau paladar	Tomar com a refeição
Raltegravir	Isentress®	Comprimido de 400 mg	400 mg de duas vezes/dia	2	Comuns: dor de cabeça e insónias Raros: exantema severo, reação de hipersensibilidade e sede extrema	Tomar com ou sem comida

*Formulação § Inclui comprimidos(s) de ritonavir

Estão disponíveis versões genéricas de alguns medicamentos, pelo que a aparência pode ser diferente. Os editores da NAM tiveram todo o cuidado na produção desta publicação. Nem a NAM, nem os seus editores, podem ser responsabilizados por eventuais imprecisões fora do seu controlo. A inclusão de informação sobre qualquer tipo de tratamentos ou terapêutica não representa aval por parte da NAM e editores. A informação deve sempre ser entendida como complemento da consulta médica.

A tabela de medicamentos antirretrovirais foi produzida pela NAM. A NAM proporciona às pessoas que trabalham na área do VIH e SIDA informações corretas e atualizadas. Visite-nos através do nosso site, onde poderá encontrar as últimas notícias sobre a infecção pelo VIH e subscrever gratuitamente a informação atualizada.

Agradecemos os seus comentários sobre os nossos recursos informativos.

NAM, Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, London, WC1X 8DP

E-mail: info@nam.org.uk SITE www.aidsmap.com

Agradecemos à ViiV Healthcare o financiamento da produção deste material informativo. A ViiV Healthcare não teve qualquer controlo editorial sobre o conteúdo da tabela de medicamentos antirretrovirais.



HIV PHARMACY ASSOCIATION