

# Fluxo para atendimento de pacientes com suspeita de febre amarela (abril/2018)

Definição de casos suspeitos de Febre Amarela:

Febre (referida ou medida) com duração de até 07 dias + 02 dos seguintes sinais/sintomas: cefaleia, artralgia, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, tontura, dor abdominal, icterícia e/ou manifestações hemorrágicas + sem história de vacinação contra a febre amarela ou que tenha sido vacinado há menos de 30 dias

Exames complementares obrigatórios:

Hemograma, TGO (AST), TGP (ALT), bilirrubinas, ureia, creatinina, sódio, potássio, INR (TP)

Exames normais

Exames discretamente alterados:  
TGO/TGP < 500 U/L e  
INR < 1,3 e  
Plaquetas > 100.000/mm<sup>3</sup> e  
U < 75 mg/dL e  
Cr < 1,2 mg/dL e  
Quadro clínico estável

Exames :  
TGO/TGP: 500 - 2.500 U/L e  
INR < 1,5 e  
Plaquetas > 90.000/mm<sup>3</sup> e  
U < 75 mg/dL e  
Cr < 1,2 mg/dL e  
Quadro clínico estável

Exames:  
TGO/TGP > 2.500 U/L e  
INR > 1,5 e/ou  
Plaquetas < 90.000/mm<sup>3</sup> e/ou  
Disfunção renal e/ou  
Sinais de gravidade \*\*

Se disponível  
coletar  
Fator V e  
amônia

Orientação de sinais de alarme\*,  
hidratação e seguimento  
do caso

Reavaliação clínica e  
laboratorial em  
12h. Orientar sobre os  
sinais de alarme\*  
(náusea, vômito, dor abdominal,  
sonolência, sangramentos)

Solicitar vaga de retaguarda local  
para internação - enfermaria

Evolução com sinais de  
gravidade\*\*

SIM

Solicitar vaga de UTI na CROSS (seguir  
fluxo de regulação regional) e manter  
paciente em sala crítica e monitorado  
até a transferência .  
Atenção: realizar gasometria e corrigir  
acidose metabólica.

SIM

Presença de sinais de gravidade\*\*/alarme\* com piora dos exames  
laboratoriais ?

\*\* Alteração do nível de consciência, sonolência, convulsão, oligúria,  
hemorragias: epistaxe, gengivorragia, hemorragia digestiva alta ou baixa

Notificação imediata (SINAN) +  
coleta de sorologia ou PCR para febre amarela

Óbito de caso suspeito: encaminhar ao SVO